

Cardisure®

také jako PERORÁLNÍ ROZTOK

Novinka



Poskytuje řešení, když je podávání tablety náročné



Kvalitnější péče o kardiologické pacienty

- Perorální roztok Cardisure® obsahuje účinnou látku pimobendan.
- Produkt je dostupný ve dvou velikostech lahviček: 42ml a 168 ml a je doplněn dávkovací stříkačkou 1,5ml a 3 ml pro snadné podávání.
- Koncentrace účinné látky je 3,5mg v 1 ml perorálního roztoku.
- Přidání perorální formy Cardisure® rozšiřuje možnosti řešení léčby kardiaků i pro pacienty, kteří mají problém s příjmem tablet.




Cardisure®

Dávkovací tabulka Cardisure®

Doporučená dávka pro podání dvakrát denně*

Hmotnost psa	Cardisure® tablety a perorální roztok							
	1.25 mg		2.5 mg		5 mg		10 mg	3.5 mg/ml
5 kg	 1.25 mg	nebo	 1/2 2.5 mg	nebo	 1/4 5 mg			 0.35 ml
10 kg			 2.5 mg	nebo	 1/2 5 mg	nebo	 1/4 10 mg	 0.7 ml
15kg					 3/4 5 mg			 1.1 ml
20kg					 5 mg	nebo	 1/2 10 mg	 1.4 ml
30kg							 3/4 10 mg	 2.1 ml
40kg							 10 mg	 2.8 ml



Více informací o produktech Cardisure® naleznete na www.cymedica.com nebo po načtení QR kódu.

Nespotřebovanou rozdělenou tabletu vraťte do blistru a spotřebujte do 3 dnů.

Dávkování v tabulce odpovídá preferované denní dávce 0,5 mg pimobendanu/kg živé hmotnosti, rozdělené do dvou denních dávek (každá 0,25 mg/kg živé hmotnosti).

Udržovací dávka by měla být upravena v souladu s klinickou odpovědí a závažností onemocnění (0,2-0,6 mg/kg denně).

Cardisure® perorální roztok 3,5 mg/ml

42 ml s 1,5 ml dávkovací stříkačkou | 168 ml s 3 ml dávkovací stříkačkou.



Cardisure®

Cymedica CZ, a.s. | Pod Nádražím 308 | CZ 268 01 Hořovice
+420 311 706 211 | info@cymedica.cz | www.cymedica.com