

S TROCHOU KLIDU,
JAKO PŘI ZENOVÉ MEDITACI,
SE VŠICHNI CÍTÍ LÉPE



Představujeme přípravek ZENALPHA® – inovaci při na sedaci psů

(medetomidin/vatinoxan)

I rychlé neinvazivní a nebolestivé zákroky a vyšetření mohou být stresující, a to nejen pro psy, ale i jejich majitele a veterináře. To je důvod proč vznikl přípravek **Zenalpha®**, který obsahuje zcela **novou kombinaci alfa-2 agonisty a periferního antagonisty**, takže sedace již nepředstavuje takový stres a jedná se o pohodovější zákrok, který spíše odpovídá zenovému zklidnění organismu.

Klinicky prokazatelný účinek

V klinické studii, do které bylo zařazeno 223 psů, dosáhla Zenalpha® v porovnání s tradičním alfa-2 agonistou následující výsledky:




Minimální nežádoucí účinky na kardiovaskulární systém při zachování spolehlivé sedace a analgie¹,



Zachování srdeční frekvence a krevního tlaku blíže normálním parametrům, což znamená zlepšení srdečního výdeje¹,

SRDEČNÍ FREKVENCE BLÍŽE NORMÁLNÍM HODNOTÁM PŘI POUŽITÍ ZENALPHY VE SROVNÁNÍ S DEXMEDETOMIDINEM

Průměrná srdeční frekvence skupiny psů (úderů za minutu)



Upraveno podle výsledků klinické studie.³



Přípravek Zenalpha® poskytuje u většiny psů rychlejší nástup účinku a kratší trvání sedace s rychlým probuzením,^{1,2}



Kombinace medetomidinu a vatinoxanu prokazatelně snižuje vazokonstrikce,³ zlepšuje průtok krve orgány a usnadňuje monitorování pacientů.⁴

MÉNĚ STRESU A VÍCE ČASU

ČAS DO NÁSTUPU ÚČINKU
5–15 minut



ve většině případů*
Upraveno podle výsledků
klinické studie.¹

DĚLKA TRVÁNÍ SEDACE
~45 minut



ve většině případů*
Upraveno podle výsledků
klinické studie.¹

Rychlejší provedení zákroku



Zenalpha® se snadno podává intramuskulárně a nástup účinku je rychlý¹, takže můžeme dříve zahájit zákrok a monitorovat pacienta optimálním způsobem.


Pacienti se dostanou domů dříve



S přípravkem Zenalpha® se psi probouzí rychleji², což přispívá k větší bezpečnosti sedace, pacient nemusí být hospitalizován a dostane se domů dříve.

- Rychlé probuzení znamená, že obvykle není nutno podávat látky na potlačení sedace,² takže veterináři nemusí aplikovat další injekce a pracovní zátěž zaměstnanců kliniky je nižší.
- Pacienti se zcela probouzí rychleji, a proto není potřeba mít obavy z dozvuků sedace, když pacienta propustíme domů, což znamená, že už ho dále nemusíme sledovat.

*Aritmetické průměry při terénní studii dosahovaly hodnoty 14 minut pro nástup sedace a 43 minut pro délku trvání sedace.¹



Více informací naleznete
na www.cymedica.cz
v sekci Knihovna – Zenalpha®
anebo po načtení QR kódu.

ROZSÁHLÉ ANESTETICKÉ A ANALGETICKÉ PŮSOBNÍ Vše, co je potřeba, od A do Z